

Szent Margit Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
Osztályvezető főorvos: Dr. Dr. Tűzkő Nándor
1032 Budapest, Bécsi út. 132
Telefon: Iroda tel.: 250-2420

Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 19. melléklete)

Hysterosalpingographia **HSG**

Tisztelt Hölgységem!

Panaszainak, vizsgálati leleteinek és a fenti diagnosztikus vizsgálat előtti kivizsgálás adatainak elemzése alapján, az Önnel történt megbeszélés után hysterosalpingographiat ajánlottunk Önnek. Ön sikertelen gyermekvárás után fordult kezelő orvosához. Ez lehet elsődleges, /nem volt még terhes/ és másodlagos /volt már korábban terhessége/. A meddőség diagnózisa 30 éves életkor alatt kettő, 30 éves életkor felett egy év után mondható ki. Jelen vizsgálatot részletes nőgyógyászati vizsgálat, hormonszint ellenőrzés és a férj andrológiai vizsgálata kell, hogy megelőzze.

A HSG célja elsősorban a kürtök átjárhatóságának igazolása, de a méh bizonyos elváltozásait, alaki rendellenességeit is kimutatja. A vizsgálatra közvetlenül menstruáció után kell sort keríteni, törekedni kell arra, hogy terhesség még véletlenül se lehessen jelen, hiszen röntgensugár alatt végzett kontrasztanyag vizsgálatról van szó.

Osztályunkon a HSG ambuláns beavatkozás, tehát kórházi felvételt nem igényel. Nem altatásban történik, csak minimális kellemetlenséggel jár, könnyű reggelit fogyaszthat.

A vizsgálat két helyen zajlik: az V. emeleten a műtőblokkban lévő nőgyógyászati kisműtőben megtörténik annak a vékony, hajlékony műanyag katéternek a felhelyezése, amin keresztül a IV. emeleti RTG osztályon a kontrasztanyagot a méhbe juttatjuk. A szállítás betegszállító fekvőkocsival történik, műtőssegéd segítségével.

A kontrasztanyag kirajzolja a méhét, illetve kétoldalt a kürtöket és átjárhatóság esetén a szabad hasüregben is megjelenik. Az anyagot nyomás alatt kell a méhbe juttatni, amely esetenként kellemetlen, feszítő érzéssel járhat, de fájdalomcsillapítást nem igényel. A vizsgálat után a katétert helyben eltávolítjuk, majd a kórterembe visszaszállítjuk. A vizsgálat után általában semmilyen fájdalom vagy kellemetlenség nem lép fel, de alhasi görcs, rossz közérzet esetén, az osztályon dolgozó nővérek segítenek.

Távozás előtt megkapja orvosától az eredményt, és megbeszélik a további teendőket.

A néhány napig tapasztalható váladékozás a hüvelyből a vizsgálat kísérő jelensége, nem kóros.